

Prot. n. 6668/SP

Reggio Calabria 14.9.2022

Oggetto: Campagna vaccinale stagionale antinfluenzale 2022/2023 ed antipneumococcica
Trasmissione modalità operative

Ai Direttori e Responsabili Medicina di Base

Distretto Reggio , Tirrenica, Locride

Ai Responsabili Centri Vaccinali di

Bagnara, Cardeto, Cittanova, Delianuova, Laureana di Borrello, Melito P. Salvo, Oppido
Mamertina, Palmi, Polistena, San Ferdinando, S.Eufemia d'Aspromonte, Taurianova, Villa San
Giovanni

Al Responsabile U.O. Medicina Preventiva - Reggio Calabria

Al Responsabile U.O. Medicina Preventiva - Siderno (anche per il successivo inoltro al
Centri Vaccinali di competenza)

e p.c.

Al Commissario Straordinario

Al Responsabile U.R.P.

A.S.P - LORO SEDI

Si inviano, in allegato, le modalità operative con le quali verrà condotta la prossima Campagna antinfluenzale stagionale ed antipneumooccca. Le SS.LL. dovranno provvedere alla diffusione delle stesse secondo le proprie competenze. In particolare i Settori di Medicina di Base dei Distretti dovranno trasmettere ai Medici Medicina Generale ed ai Pediatri convenzionati. La suddetta campagna sarà avviata presumibilmente nella prima metà di Ottobre, in relazione all'effettiva disponibilità del vaccino, e proseguirà nei mesi successivi.

Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Il Direttore

(Dott. Sandro Giuffrida)

Reggio Calabria 14.9.2022

Oggetto: Campagna Vaccinale Antinfluenzale 2021/2022 e antipneumococcica coniugata 13-valente

Tenuto conto delle raccomandazioni del Ministero della Salute ed al fine di razionalizzare la distribuzione del vaccino antinfluenzale, si ritiene necessario che siano osservati i seguenti criteri:

A) Il vaccino è raccomandato e dovrà essere somministrato gratuitamente ai soggetti compresi nelle categorie indicate dal Ministero della Salute e dal vigente Calendario Vaccinale Regionale e cioè:

- 1) **adulti di età pari o superiore a 60 anni e bambini di età tra 6 mesi e 6 anni**
- 2) **donne che all'inizio della stagione epidemica si trovino in gravidanza e nel periodo post-partum**
- 3) **bambini di età superiore ai 6 anni, ragazzi ed adulti fino a 60 anni d'età affetti da:**
 - a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronica ostruttiva)
 - b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
 - c) diabete mellito ed altre malattie metaboliche inclusi gli obesi con BMI>30
 - d) insufficienza renale/ surrenale cronica
 - e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
 - f) tumori e in corso di trattamento chemioterapico
 - g) malattie congenite o acquisite che comportino carenza produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
 - h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
 - i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
 - j) patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
 - k) epatopatie croniche
- 4) **bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale**
- 5) **individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti**
- 6) **medici e personale sanitario di assistenza**
- 7) **familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, anche se questi ultimi siano vaccinati**
- 8) **soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze di polizia e vigili del fuoco)**
- 9) **personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani**
- 10) **donatori di sangue**
- 11) **lavoratori particolarmente esposti per l'attività svolta anche al fine di evitare cali di produttività**

B) La somministrazione del vaccino sarà effettuata a cura dei Responsabili delle Strutture Sanitarie a ciò deputate presso le sedi vaccinali o dai MMG e PLS che abbiano fatto richiesta per la somministrazione ai propri assistiti, anche non ambulabili;

C) Il vaccino dovrà essere somministrato:

- ai bambini di età compresa fra 6 mesi e 6 anni, agli ultrasessantenni e ai soggetti a rischio per motivi socio-occupazionali previa identificazione e verifica della condizione (età o occupazione) che giustifichi la vaccinazione;

- ai soggetti a rischio per motivi di salute (vedi elenco al punto A di questo documento): se la vaccinazione è effettuata dal MMG o PLS anche per semplice conoscenza diretta di tale condizione di rischio; nelle altre sedi previa esibizione di richiesta medica o esenzione per patologia o idonea documentazione sanitaria.

D) la fornitura del vaccino sarà frazionata in dipendenza della disponibilità dello stesso. Alla fine della campagna antinfluenzale i Responsabili delle Strutture Vaccinali e i Medici che hanno partecipato alla stessa dovranno compilare e consegnare alla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica una scheda statistica riassuntiva con il totale delle vaccinazioni effettuate e dei vaccinati divisi per classi d'età (come da allegato). La consegna di detta scheda, da parte dei Medici di base e PLS è presupposto imprescindibile per la corresponsione del compenso relativo ai sensi dei vigenti AA. CC. NN. (o A.I.R.); i Responsabile dei centri di vaccinazione e i Sigg. Medici dovranno prestare attenzione a ritirare solo le dosi di vaccino che certamente saranno utilizzate;

E) sarà anche possibile approvvigionarsi del vaccino antipneumococcico coniugato 13-valente, la cui somministrazione, effettuabile dallo stesso Medico simultaneamente alla vaccinazione antinfluenzale, è fortemente raccomandata per il suo riconosciuto intrinseco valore protettivo, ancora più importante in costanza di epidemia Covid-19. Il vaccino è offerto gratuitamente a tutti i soggetti a rischio di cui ai punti A3 e A5 nonché per età a tutti i soggetti che hanno compiuto 65 anni fino al compimento dei 66 e 70 anni fino al compimento dei 71 anni; come negli anni precedenti, ai fini della corresponsione del compenso per la somministrazione, pari a quello previsto per il vaccino antinfluenzale, sarà necessario produrre alla suddetta UOC elenco nominativo comprensivo di date di nascita dei soggetti vaccinati;

F) come riportato nella Circolare Ministero Salute sulla Vaccinazione Antinfluenzale 2022 è possibile altresì la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID19.

G) la consegna delle dosi al MMG o PLS per la somministrazione ambulatoriale o domiciliare, con le modalità sopra indicate, saranno effettuate in perfetta autonomia e col personale ivi operante, a cura del Responsabile, presso le seguenti Strutture;

- per la città di Reggio Calabria presso la U.O. di Medicina Preventiva e Vaccinazioni - V.le Calabria tr. V (consegna vaccini ai Signori Medici, che dovranno essere forniti di idoneo contenitore per trasporto, previo accordo contattando i seguenti numeri 0965347353, 3297978214, 3394622747)

- per i restanti Comuni dell'ambito territoriale A.S.P. tutti i Centri Vaccinali e gli Uffici periferici di Igiene che già svolgono attività vaccinali.

Il Direttore

(Dott. Sandro Giuffrida)

RILEVAZIONE DEL NUMERO DI VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI STAGIONALI

REGIONE: _____

TIPOLOGIA DI VACCINO (PER OGNI TIPOLOGIA DI VACCINO COMPILARE UNA TABELLA DIVERSA):

- Influvac S (Mylan)
- Vaxigrip tetra (SP)
- FluceIVax (Seqirus)
- Efluelda (Sanofi)
- Fluarix tetra (GSK)
- Fluad tetra (Seqirus)
- Fluenz tetra (Astra Zeneca)

Categorie	Fasce di età									
	6-23 mesi (2 dosi)	2-4 anni (2 dosi)	5-6 anni (2 dosi)	7-8 anni (2 dosi)	9-14 anni	15-17 anni	18-44 anni	45-59 anni	60-64 anni	≥ 65 anni
Soggetti di età pari o superiore a 60 anni										
Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 59 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2)										
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico										
Donne in gravidanza										
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti										
Medici e personale sanitario di assistenza										
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio										
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori										
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.										
Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)										
Donatori di sangue										
Totale										

LEGENDA: le celle grigie non vanno considerate;